

Die typischen Arten auf einen Blick



Höckerschwan (*Cygnus olor*)

Typisch ➤ orangefarbener Schnabel mit Höcker, durchziehende Sing- und Zwergschwäne besitzen schwarz-gelbe Schnäbel. Größe: bis 160 cm



Saatgans (*Anser fabalis*)

Typisch ➤ schwarz-orangefarbener Schnabel, dunkel gefärbter Kopf, etwas größer als die Blässgans, dunklere Stimme, Männchen und Weibchen gleiche Farbe, Größe: bis 75 cm



Blässgans (*Anser albifrons*)

Typisch ➤ kleiner, orangefarbener Schnabel, Blässe an der Stirn, erwachsene Vögel mit schwarzen Streifen am Bauch, kleiner als Graugans, Männchen/Weibchen gleiche Farbe, Größe: bis 70 cm



Graugans (*Anser anser*)

Typisch ➤ kräftiger, orangefarbener Schnabel, eher hellgraues Gefieder, größte graue Gans, Männchen und Weibchen gleiche Farbe, Größe: bis 84 cm



Brandgans (*Tadorna tadorna*)

Typisch ➤ bunte Gefiederfärbung, roter Schnabel, beim Männchen mit Höcker, in der Größe zwischen Gans und Ente. Größe: bis 65 cm



Schnatterente (*Anas strepera*)

Typisch ➤ Männchen ist fast durchgehend braun, beim Auffliegen zeigen Männchen und Weibchen ein auffälliges schwarz-weißes Feld auf den Flügeloberseiten, Weibchen braun, Größe: bis 56 cm



Pfeifente (*Anas penelope*)

Typisch ➤ Männchen sehr ruffreudig. Zum Frühjahr hin sehr buntes rostfarbenes Gefieder mit hellem Streifen auf dem Kopf. Weibchen unauffälliger rostrot, Größe: bis 50 cm

Krickente (*Anas crecca*)

Typisch ➤ Kleine Schwimmte, Männchen mit buntem Gefieder, auffällige gelbe Unterseite am Körperende, zur Brutzeit ruffreudig. Weibchen braun, Größe: bis 38 cm



Stockente (*Anas platyrhynchos*)

Typisch ➤ Schwimmte, graubraune Gefiederfarbe, Schwanzfedern kringeln sich beim Männchen am Körperende, Weibchen braun. Größe: bis 60 cm



Spießente (*Anas acuta*)

Typisch ➤ Schwimmte, Männchen mit braun-weißer Halszeichnung und langem Federspieß am Körperende, Weibchen braun mit weniger stark ausgeprägtem Spieß, Größe: bis 62 cm



Knäkente (*Anas querquedula*)

Typisch ➤ Kleine Schwimmte, Männchen mit breitem weißen Überaugenstreif, grau-weißem Rückengefieder, Weibchen braun, Größe: bis 41 cm



Löffelente (*Anas clypeata*)

Typisch ➤ Schwimmte, Männchen mit buntem Gefieder, gelbem Auge, sehr breiter Schnabel, bei Nahrungssuche flache Körperhaltung, Weibchen braun. Größe: bis 52 cm



Tafelente (*Aythya ferina*)

Typisch ➤ Tauchente, Männchen rotbraun mit hellgrauem Rückengefieder, rote Augen, Weibchen unscheinbarer, Größe: bis 49 cm



Reiherente (*Aythya fuligula*)

Typisch ➤ Tauchente, Männchen schwarz-weiß mit schwarzem Federschopf am Hinterkopf, gelbe Augen, Weibchen unscheinbarer z.T. mit weißem Gefiederring um Schnabel, Größe: bis 47 cm



Schellente (*Bucephala clangula*)

Typisch ➤ Tauchente, Männchen schwarz-weiß mit weißem Fleck oberhalb des Schnabels, gelbe Augen, Weibchen unscheinbarer grau-braun, Größe: bis 48 cm





Zwergsäger (*Mergellus albellus*)

Typisch ➤ Kleiner Säger, Männchen weiß mit schwarzem Muster, Weibchen grau-braun mit markantem Augenfleck, Größe: bis 44 cm



Gänsesäger (*Mergus merganser*)

Typisch ➤ Großer Säger, Männchen weiß mit schwarzem Muster, rotem Schnabel, Weibchen grau-braun mit markantem Schopf am Hinterkopf, Größe: 68 cm



Zwergtaucher (*Tachybaptus ruficollis*)

Typisch ➤ Kleinster Taucher, fast einfarbig braun, aber am Schnabelgrund zur Brutzeit ein markanter gelber Strich, Männchen und Weibchen nicht unterscheidbar, Größe: bis 29 cm



Haubentaucher (*Podiceps cristatus*)

Typisch ➤ Größter Taucher, durch die Haube am Kopf unverwechselbar, Männchen und Weibchen nicht unterscheidbar, im Herbst grau-weißes Federkleid Größe: bis 51 cm



Schwarzhalstaucher (*Podiceps nigricollis*)

Typisch ➤ Kleiner Taucher, gelbe Schmuckfedern hinter den sehr roten Augen, Männchen und Weibchen sind nicht unterscheidbar, im Herbst grau-weißes Federkleid, Größe: bis 34 cm



Kormoran (*Phalacrocorax carbo*)

Typisch ➤ Je nach Alter unterschiedlich stark schwarz gefärbt, gelber Schnabel, grüne Augen, liegt sehr tief im Wasser, Männchen und Weibchen sind nicht unterscheidbar, Größe: bis 94 cm



Rohrdommel (*Botaurus stellaris*)

Typisch ➤ Schreitvogel, beige tarnfarben, nimmt bei Gefahr oder Störung Pfahlstellung ein, Männchen und Weibchen sind nicht unterscheidbar, Größe: bis 81 cm



Silberreiher (*Casmerodius albus*)

Typisch ➤ Schneeweiß gefärbt, etwas kleiner als Graureiher, schwarze Beine, Männchen und Weibchen sind nicht unterscheidbar, Größe: bis 100 cm

Graureiher (*Ardea cinerea*)

Typisch ➤ Grau-weiße Färbung, Jungvögel insgesamt blasser und ohne schwarzen Streifen am Kopf, Männchen und Weibchen sind nicht unterscheidbar, Größe: bis 102 cm



Fischadler (*Pandion haliaetus*)

Typisch ➤ Braun-weiß abgesetztes Gefieder, markanter brauner Streifen am Kopf, Federschopf, am Hinterkopf, Weibchen mit bräunlichem Fleck auf Brust, Größe: bis 60 cm



Kornweihe (*Circus cyaneus*)

Typisch ➤ Männchen silbergrau, Weibchen braun gemustert, beide mit weißem Fleck am Bürzel, beide im Flug mit V-förmiger Flügelstellung, Größe: bis 55 cm



Rohrweihe (*Circus aeruginosus*)

Typisch ➤ Männchen mit hellgrau-brauner Flügelzeichnung, Weibchen dunkelbraun mit heller Kopfhaube, beide im Flug mit V-förmiger Flügelstellung, Größe: bis 55 cm



Rotmilan (*Milvus milvus*)

Typisch ➤ Ruhiger, gleitender Flug, bräunlich-rotes Gefieder, stark gegabelter Schwanz, Größe: bis 72 cm



Seeadler (*Haliaeetus albicilla*)

Typisch ➤ Sehr groß, Flügel breitartig breit, je nach Alter unterschiedlich gefärbt, Altvögel mit gelbem Schnabel, weißen Schwanzfedern, Weibchen größer als Männchen, Größe: bis 92 cm



Mäusebussard (*Buteo buteo*)

Typisch ➤ Innerhalb der Art sehr unterschiedliche Gefiederfärbung von überwiegend weiß bis gänzlich dunkelbraun, im Flug mit breitartig gerader Flügelstellung, Größe: bis 58 cm



Wanderfalke (*Falco peregrinus*)

Typisch ➤ Markante Kopfzeichnung, Oberseite schiefergrau, sehr spitze Flügel, Männchen kleiner als Weibchen, Größe: bis 51 cm





Kranich (*Grus grus*)

Typisch ➤ Großer Schreitvogel, grau am Kopf mit rotem unbefiederten Fleck. Jungvögel mit rost-rotem Kopf, Männchen und Weibchen sind nicht unterscheidbar, Größe: bis 119 cm



Wasserralle (*Rallus aquaticus*)

Typisch ➤ Braun gefleckter Rücken, blaugraues Bauchgefieder, roter spitzer Schnabel, Männchen und Weibchen sind nicht unterscheidbar, Küken pechschwarz, Größe: bis 26 cm



Blässhuhn (*Fulica atra*)

Typisch ➤ Rallenart, schwarzes Gefieder, Schnabel und Stirn weiß, Männchen und Weibchen sind nicht unterscheidbar, Größe: bis 26 cm



Austernfischer (*Haematopus ostralegus*)

Typisch ➤ Watvogel, stark abgesetzte schwarz-weiße Gefiederfärbung, kräftiger roter Schnabel, rote Beine, Männchen und Weibchen sind nicht unterscheidbar, Größe: bis 44 cm



Goldregenpfeifer (*Pluvialis apricaria*)

Typisch ➤ Watvogel, kurzer Schnabel, Oberseite braungelb gemustert, Unterseite im Frühjahr schlicht braunweiß, Männchen später mit schwarzer Färbung am Hals und Bauch, Größe: bis 28 cm



Kiebitz (*Vanellus vanellus*)

Typisch ➤ Watvogel, stark abgesetzte schwarz-weiße Gefiederfärbung, Federschopf am Hinterkopf, Größe: bis 31 cm



Großer Brachvogel (*Numenius arquata*)

Typisch ➤ Watvogel, sehr großer, gebogener Schnabel, braun gemustertes Gefieder, Weibchen größer als Männchen, flötende Stimme, Größe: bis 57 cm



Uferschnepfe (*Limosa limosa*)

Typisch ➤ Watvogel, rötlich-braunes Gefieder, langer, gerader Schnabel, lange Beine, Männchen lebhafter gefärbt als Weibchen, Größe: bis 42 cm

Bekassine (*Gallinago gallinago*)

Typisch ➤ Watvogel, braun gemustertes Gefieder, langer Schnabel, kurze Beine, Männchen und Weibchen nicht unterscheidbar, Größe: bis 28 cm



Flussuferläufer (*Actitis hypoleucos*)

Typisch ➤ Watvogel, oft an Uferändern, auch auf Stegen, braunes Rückengefieder und weiße Unterseite, wippt oft mit dem Körperende, im Flug mit weißem Streifen im Flügel, Größe: 20 cm



Dunkler Wasserläufer (*Tringa erythropus*)

Typisch ➤ Watvogel, grau schattiertes bis schwarzes Gefieder, langer roter Schnabel, rote Beine, Flügeloberseite einfarbig ohne Zeichnung, Männchen und Weibchen gleich, Größe: bis 33 cm



Rotschenkel (*Tringa totanus*)

Typisch ➤ Watvogel, braun-grau gemustertes Gefieder, langer roter Schnabel, rote Beine, Körper oft wippend, Flügeloberseite mit markanter weißer Zeichnung, Größe: bis 27 cm



Grünschenkel (*Tringa nebularia*)

Typisch ➤ Watvogel, braun-grau-weiß gemustertes Gefieder, langer gelber, leicht nach oben gebogener Schnabel, gelbe Beine, Flügeloberseite einfarbig ohne Zeichnung, Größe: bis 34 cm



Bruchwasserläufer (*Tringa glareola*)

Typisch ➤ Watvogel, zierlicher Körperbau, braun-grau-weiß gemustertes Gefieder, mittellanger Schnabel, markanter weißer Überaugenstreif, gelbgrüne Beine, Größe: bis 21 cm



Kampfläufer (*Philomachus pugnax*)

Typisch ➤ Watvogel, Männchen größer als Weibchen, bunte Halskrause, führen Balztanz auf, Schnabel mittelgroß, Rückengefieder geschuppt, Größe: Männchen bis 32 cm, Weibchen bis 26 cm



Lachmöwe (*Chroicocephalus ridibundus*)

Typisch ➤ Schwarzer Kopf, rote Beine, roter Schnabel, weiß-graue Gefiederzeichnung, Männchen und Weibchen gleich, Größe: bis 39 cm





Sturmmöwe (*Larus canus*)

Typisch ➤ gelber Schnabel ohne Fleck, gelbe Beine, größer als Lachmöwe, kleiner als Silbermöwe, im ersten Jahr bräunliches Gefieder, im zweiten Jahr ausgewachsen, Größe: bis 46 cm



Silbermöwe (*Larus argentatus*)

Typisch ➤ gelber Schnabel mit rotem Fleck, gelbe bis rosafarbene Beine, größer als Sturmmöwe, im ersten und zweiten Jahr bräunliches Gefieder, im dritten Jahr ausgewachsen, Größe: bis 60 cm



Heringsmöwe (*Larus fuscus*)

Typisch ➤ gelber Schnabel mit rotem Fleck, leuchtend gelbe Beine, dunkles Rücken- und Flügelgefieder, Jungvögel im ersten Jahr bräunliches Gefieder, Größe: bis 56 cm



Trauerseeschwalbe (*Chlidonias niger*)

Typisch ➤ schwarz-graues Gefieder, lange, schlanke Flügel, wellenförmig, schwebendes Flugbild, Größe: bis 26 cm



Feldlerche (*Alauda arvensis*)

Typisch ➤ Kleinvogel in niedrigen Brachen und auf Grünland, braun-gemustertes Gefieder, Federbusch, ausdauernder Singflug, Größe: bis 18 cm



Bartmeise (*Panurus biarmicus*)

Typisch ➤ Kleinvogel der Schilfröhrichte, Rückengefieder gelb-braun mit weißen Streifen, langer Schwanz, Männchen mit grauem Kopf und schwarzem Bartstreif, typische Rufe, Größe: bis 15 cm



Feldschwirl (*Locustella naevia*)

Typisch ➤ Kleinvogel in Brachen und Röhricht, gestreiftes Rückengefieder, laut klirrender Gesang, Größe: bis 13,5 cm



Rohrschwirl (*Locustella luscinioides*)

Typisch ➤ Röhrichtvogel, einfarbiges Gefieder, unauffällig, abgerundete Schwanzfedern, leise schwirrender Gesang, Größe: bis 15 cm

Schilfrohrsänger (*Acrocephalus schoenobaenus*)
Typisch ➤ Röhrichtvogel, markanter Überaugenstreif, gestreiftes Rückengefieder, typischer Singflug von Warte aus, schnarrender Gesang, Größe: bis 13 cm



Teichrohrsänger (*Acrocephalus scirpaceus*)
Typisch ➤ Röhrichtvogel, einfarbiges, unauffälliges Gefieder, leise-schwatzender Gesang, Größe: bis 14 cm



Schwarzkehlchen (*Saxicola rubetra*)
Typisch ➤ Kleinvogel auf Brachen und an Wegändern, Männchen mit orangefarbener Brust, Wartensänger, Größe: bis 13 cm



Nachtigall (*Luscinia megarhynchos*)
Typisch ➤ Kleinvogel der Feuchtgebüsche, rotbraunes Gefieder, singt aus der Deckung heraus, markanter Gesang, Größe: bis 16,5 cm



Blaukehlchen (*Luscinia svecica*)
Typisch ➤ Kleinvogel feuchter Ufer mit Röhricht und Weidengebüsch, markanter blauer Fleck an Kehle mit weiß in der Mitte, markanter Gesang, Größe: bis 14 cm



Wiesenpieper (*Anthus pratensis*)
Typisch ➤ Kleinvogel in niedrigen Brachen und auf Grünland, braun-gemustertes Gefieder, Singflug von Warten aus, Größe: bis 15,5 cm



Wiesenschafstelze (*Motacilla flava*)
Typisch ➤ Kleinvogel auf strukturreichem Grünland, Männchen strahlend gelbes Gefieder, Weibchen blasser, unauffälliger Gesang, Größe: bis 16 cm



Rohrhammer (*Emberiza schoeniclus*)
Typisch ➤ Kleinvogel des Röhrichts und von Brachen, Männchen mit schwarzem Kopf, Größe: bis 15,5 cm

